




## Scheda di Botanica N. 107 - Fig. n. 1

*Senecio inaequidens* DC.Prodr

**Senecione sudafricano**



**Forma biologica:** Ch suffr - Camefite suffruticose. Piante con fusti legnosi solo alla base, generalmente di piccole dimensioni.

**Descrizione:** Pianta perenne, molto invasiva, radici poco profonde, fusti legnosi alla base, striati, ramificati, altezza 30÷100 cm

**Foglie:** sono lievemente carenate intere, a forma lineare, dentate irregolarmente sui bordi. Quelle superiori sono progressivamente più piccole con picciolo più breve.

**Fiori:** corimbi irregolari, numerosi capolini gialli, fiori periferici ligulati, centrali tubulosi, brattee brunastre all'apice; Sono ermafroditi, più precisamente i fiori del raggio (quelli ligulati) sono femminili; mentre quelli del disco centrale (tubulosi) sono bisessuali.

**Frutti:** sono degli acheni cilindrici e pubescenti, provvisti di un pappo biancastro formato da esili e sottili peli tutti della stessa lunghezza

**Tipo corologico:** Africana - Africa..

**Antesi:** (Fioritura): Giugno - Dicembre

**Distribuzione in Italia:** **Specie neofita, naturalizzata in tutto il territorio.**

**Habitat:** ha una forte capacità di riproduzione, praticamente ubiquitario si dissemina lungo le vie di comunicazione: strade, ferrovie, corsi d'acqua, ha la capacità di colonizzare diversi tipi di habitat, 0-1500m

### Tassonomia filogenetica

<b>Regno</b>	Plantae
<b>Phylum o divisione</b>	Magnoliophyta (Angiosperme)
<b>Classe</b>	Magnoliopsida (Dicotiledoni)
<b>Ordine</b>	Asterales
<b>Famiglia</b>	Asteraceae
<b>Genere</b>	<i>Senecio</i>
<b>Specie</b>	<i>S. inaequidens</i> DC.Prodr

**Etimologia:** Il nome generico deriva dal latino “senex” = vecchio, con riferimento ai frutti ricoperti di pelosità biancastra che ricordano i capelli delle persone anziane, il nome specifico dal latino con il significato di “dente irregolare” a indicare le foglie lievemente denticolate

**Curiosità:** In Europa il *Senecio inaequidens* è considerato **altamente invasivo**. Data la sua facilità con cui si adatta ai vari habitat, è in grado in poco tempo di sostituire le specie indigene. In particolare essendo tossica per il bestiame, costituisce un grosso problema per l'agricoltura. **In Svizzera (ma anche in altri paesi europei) è inserita nella “Lista Nera” della Commissione svizzera per la conservazione delle piante selvatiche”.**




**CLUB ALPINO ITALIANO**

**SEZIONE DI DOLO**

“Riviera del Brenta”

Fondata nel 1952

Scheda di Botanica N. 107 - Fg. n. 2  
*Senecio inaequidens* DC. Prodr



Fotografate: Lessinia

© Piera Pellizzer, Emilio Rosso




CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI DOLO

"Riviera del Brenta"

Fondata nel 1952

Scheda di Botanica N. 107 - Fg. n. 3  
*Senecio inaequidens* DC. Prodr



**Bibliografia:** Archivio personale; Flora d'Italia, S. Pignatti, Edagricole, 2' edizione. - Flora Alpina, D. Aeschmann & Al. 2004 www.biolib.de, biblioteca biologica virtuale. Immagini e dati nel pubblico dominio perché non c'è il relativo copyright