




Scheda di Botanica N. 77 - Fg. n. 1

***Daphne blagayana* Freyer**

Rododendro bianco



Forma biologica: NP - Nano-Fanerofite. Piante legnose con gemme perennanti poste tra 20 cm e 2 m dal suolo. Camefita fruticosa

Descrizione: Pianta erbacea perenne h 10–30cm presenta un fusto strisciante con rami ascendenti debolmente pelosi che portano foglie solo all'apice.

Foglie: persistenti (3-6 cm) avvicinate in rosette all'apice dei rami, ellittico-allungate, tronche o bruscamente arrotondate, brevemente mucronate, coriacee, sessili, glabre e lucide.

Fiori: sono capolini terminali con 10-15 fiori, brevemente pedunculati, biancastri, molto profumati, con brattee sericeo-lucenti, chiare, lunghe circa 10 mm, persistenti.

Frutto: drupa biancastra, glabra, ialina

Tipo corologico (fitosociologia): SE-Europ. - Soprattutto nella regione Carpatico-Danubiana.

Antesi (Fioritura): Marzo - Maggio

Distribuzione in Italia: Esclusivamente nelle **Prealpi Clautane**. Il Friuli è l'unica regione italiana in cui è segnalata la specie. **E' una rarità!**

Habitat: Predilige mughete, pinete a pino nero d'Austria e orniello. Suolo calcareo. Areale con nucleo distributivo centrale balcanico. 600-1500m

Tassonomia filogenetica

Regno	Plantae
Phylum o divisione	Magnoliophyta (Angiosperme)
Classe	Magnoliopsida (Eudicotiledoni)
Ordine	Malvales
Famiglia	Thymelaeaceae Juss
Genere	<i>Daphne</i>
Specie	<i>D. blagayana</i> Freyer

Etimologia: Il nome generico deriva da 'dàphne', nome greco dell'alloro, per le foglie sempreverdi di alcune specie; il nome specifico è dedicato al Conte Richard Blagay, che nel 1837 ricevette un campione da un contadino e lo inviò al botanico Freyer di Lubiana, che descrisse la specie.

Curiosità: La prima stazione italiana di questa specie è stata individuata dal punto di vista scientifico nell'aprile 1989 dal Sig. **Adriano Bruna** nella Valle Inglogna, cui si sono successivamente aggiunte altre stazioni tutte comprese nelle Prealpi Clautane. Fino ad allora si riteneva che questa specie fosse un endemita balcanico.

L'ambiente prediletto di questa specie sono le mughete fisionomiche ad altitudine tra 600 e 1300 metri con esposizione variabile (predilige i quadranti settentrionali ma non disdegna in alta quota l'esposizione a meridione). Tende a formare estese popolazioni i cui candidi cupolini in fioritura risaltano fortemente tra l'erba ancora secca, spandendo all'intorno un intenso profumo. **Molto velenosa**



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI DOLO

“Riviera del Brenta”

Fondata nel 1952

Scheda di Botanica N. 77 - Fg. n. 2

Daphne blagayana Fréyer



Fotografate: Prealpi Clautane, Val Inglnagna

© Piera Pellizzer, Emilio Rosso



CLUB ALPINO ITALIANO


SEZIONE DI DOLO

"Riviera del Brenta"

Fondata nel 1952

Scheda di Botanica N. 77 - Fg. n. 3

Daphne blagayana Freyer



Bibliositografia: Archivio personale; Flora Alpina D. Aeschimann & Al. 2004 - www.biolib.de, biblioteca biologica virtuale; Immagini e dati nel pubblico dominio perché non c'è il relativo copyright;